

Вид: Боби турецькі (квасоля багатоквіткова) *Phaseolus coccineus* L.

Заявка № 21465001 Назва сорту: Оброшинська місцева **Заявник (код):** 1658 **Володілець патенту (код):** 1658

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.11.2024 **Патент №** 240501

Дата пріоритету: 09.12.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: розташування	підземне	2	
2	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
3	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
4	Рослина: початок завивання	середній	5	
5	Рослина: швидкість завивання	повільна	3	
6	Стебло: за довжиною	середнє	5	
7	Стебло: за товщиною	середнє	5	
8	Стебло: пігментація	відсутня	1	
9	Примордiальний листок: форма	широкоюйцеподібна	3	
10	Примордiальний листок: форма верхівки	тупа	3	
11	Примордiальний листок: черешок за довжиною	середній	5	
12	Примордiальний листок: забарвлення	зелене	2	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
14	Листок: зморшкватість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
16	Верхівковий листочок: форма	ромбовидно-видовжена	3	
17	Верхівковий листочок: форма верхівки	загострена	1	
18	Верхівковий листочок: антоціанове забарвлення жилок	середнє	5	
19	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
20	Квітка: розмір приквітка	середній	5	
21	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
22	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
23	Чашечка: форма верхньої губи	тупа	1	
24	Квітконіжка: за довжиною відносно чашечки	довша чашечки	7	
25	Біб: за довжиною	середній	5	
26	Біб: за шириною (посередині)	широкий	7	
27	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	від еліптичної до яйцеподібної	1	
28	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
29	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
30	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	2	
31	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
32	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначалась	0	
33	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначалась	0	
34	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
35	Біб: ступінь вигину	помірний	5	
36	Біб: форма вигину	увігнута	1	
37	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2	
38	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
39	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3	
40	Біб: характер поверхні	гладенький	3	
41	Біб: звування (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
42	Білонасінні сорти. Насінина: забарвлення нестиглої насінини (на початку потовщення бобів)	світло-зелене	2	
43	Насіння: маса	велика	7	
44	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
45	Сорти з ниркоподібними насінинами. Насінина: ступінь вигину	середній	5	
46	Насінина: форма поперечного перерізу	еліптична	3	
47	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
48	Насінина: кількість кольорів	один	1	
49	Насінина: за основним забарвленням (найбільша зона)	біла	1	
50	Насінина: за переважаючим вторинним забарвленням	ознака не визначалась	0	
51	Насінина: розподіл переважаючого вторинного забарвлення	ознака не визначалась	0	
52	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
53	Насінина: кільце навкруг рубчика	наявне	9	
54	Насінина: забарвлення кільця навкруг рубчика	однакове з фоном насінини	1	
55	Час цвітіння: (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3	

**За інформацією, наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 6,3. Стійкість до обсіпання, балів – 9. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 20. Висота рослин, см – 50. Тривалість вегетації рослин, днів – 115. Маса 1000 зерен, г – 1030. Пошкодження шкідниками (бал 1–9): зернівкою – 3. Ураженість хворобами (бал 1–9): антракнозом – 3; аскохітозом – 3; бактеріозом – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.