

Вид: Гарбуз великоплідний *Cucurbita maxima* Duch.

Заявка № 20455002 Назва сорту: ФАРАОН **Заявник (код):** 1939 **Власник сорту (код):** 1939

Володілець патенту (код): 1939

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 12.11.2024 **Патент №** 240495

Дата пріоритету: 30.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.11.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240686

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім`ядолей	широкоеліптична	2	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	середнє	5	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: діаметр (в основі)	середній	5	
8	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
9	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	короткий	3	
10	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
11	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
12	Плід: за довжиною	середній	5	
13	Плід: діаметр	середній	5	
14	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
15	Плід: форма	поперечно-помірно еліптична	3	
16	Плід: положення найширшої частини	посередині	2	
17	Плід: профіль базального кінця (біля плодоніжки)	помірно заглиблений	4	
18	Плід: профіль апікального кінця (включно з квітковим рубцем)	увігнутий	1	
19	Плід: борізки	наявні	9	
20	Плід: відстань між борізками	середня	5	
21	Плід: борізки за глибиною	мілкі	3	
22	Плід: кількість кольорів шкірки	один	1	
23	Плід: основне забарвлення шкірки	сіре	9	
24	За винятком сортів із основним забарвленням шкірки: кремовим або білим. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	слабка	3	
25	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: вторинне забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
26	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками. Плід: інтенсивність вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти з двома та більше кольоровими відтінками чи інтенсивністю. Плід: розподіл вторинного забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
28	Плід: характер поверхні	гладенький	1	
29	Плід: коркове утворення	відсутнє або дуже розсіяне	1	
30	Плід: корковий шар за товщиною	ознака не визначалась	0	
31	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	червонувато-оранжеве	3	
33	Насінина: розмір	великий	7	
34	Насінина: форма	помірноеліптична	2	
35	Насінина: забарвлення оболонки	світло-коричневе	3	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 36,9. Середня маса плоду, кг – 4,7. Тривалість періоду до досягання, діб – 130. Довжина головного стебла, см – 280. Тип стебла: 1 – детермінантний. Вміст сухої речовини, % – 14,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7; антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 7; плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7; фузаріоз (*Fusarium nivium* E. Sm.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.