

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

**Заявка № 24118004 Назва сорту:** Сакса 2 **Заявник (код):** 1163 **Підтримувач сорту (код):** 1163

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240769**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	пряме	1	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	широкообернено- яйцеподібна	5	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мала	1	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	відсутні	1	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	малий	3	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2	
21	Коренеплід: форма основи	округла	4	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1	
28	Час достигання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 15. Тривалість періоду до достигання, діб – 25. Середня маса плоду, г – 10. Вміст сухої речовини, % – 5,1; вітаміну С, мг/100 г – 36,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.