

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 24909088 Назва сорту:** ЛКЮН4121 **Заявник (код):** 2720 **Власник сорту (код):** 2720**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 15.11.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240668****Орган, що провів випробування:** Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|---|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | помірне | 5 | |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом | малий | 3 | |
| 6 | Листок: положення пластинки у просторі | пряме | 1 | |
| 8 | Волоть: час цвітіння | середній | 5 | |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | помірне | 5 | |
| 11 | Волоть: антоціанове забарвлення пилляків | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками | малий | 3 | |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок у просторі | пряме | 1 | |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок | від малої до середньої кількості | 4 | |
| 15 | Качан: час появи шовку | середній | 5 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | слабке | 3 | |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | слабке | 3 | |
| 18 | Волоть: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжузлів | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 21 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | довга | 7 | |
| 22 | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | довга | 7 | |
| 23 | Волоть: бічна гілочка за довжиною | від середньої до довгої | 6 | |
| 24,1 | Лиш для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною | від довгої до дуже довгої | 8 | |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | від середнього до великого | 6 | |
| 26 | Листок: пластинка за ширину | широка | 7 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | коротка | 3 | |
| 28 | Качан: за довжиною | від середньої до довгої | 6 | |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | від великого до дуже великого | 8 | |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | від середньої до великої | 6 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидноподібний | 4 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовте | 3 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки | жовто-оранжеве | 4 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | від помірного до сильного | 6 | |