

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 23045007 Назва сорту:** САЦ224914 **Заявник (код):** 2863 **Володілець патенту (код):** 2863

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 23.12.2024 **Патент № 240843**

**Дата пріоритету:** 28.02.2023

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глясуватість	помірна	2	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	3,33	3,60
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,20	0,57
+, - до усередненої урожайності, %	1,0	6,4	18,8
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	107	111	114
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	172,3	170,4	182,7
Висота рослини, см	60,4	79,4	77,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,3	9,5	11,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	8
Вміст білка, %	38,8	38,5	37,6
Вміст олії, %	21,9	21,9	22,5
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.