

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045009 Назва сорту: СТАЙН 04Н32 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Володілець патенту (код): 2788

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.12.2024 **Патент №** 240827

Дата пріоритету: 08.03.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.12.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240797

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насіннина: розмір	середній	5	
14	Насіннина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насіннина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насіннина: забарвлення в насінневій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насіннина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насіннина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	від дуже раннього до раннього	2	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насіннин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насіннин	середня	5	
23	Насіння: глясуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,03	3,13	3,03
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,05	3,33	3,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,02	0,20	0,49
+, - до усередненої урожайності, %	1,0	6,4	16,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,08	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	93	113	109
Маса 1000 насіннин (за стандартної вологості), г	180,8	161,7	183,6
Висота рослини, см	63	87,8	88,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,6	13	13,4
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Вміст білка, %	39,4	40,1	39,3
Вміст олії, %	22,5	21,8	22,4
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.