

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.

Заявка № 17258001 Назва сорту: Панянка Заявник (код): 1601 Власник сорту (код): 1601

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 02.08.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180892

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------------|-----|----------|
| 1 | Дерево: за силою росту | середнє | 5 | |
| 2 | Дерево: галузнення | помірне | 5 | |
| 3 | Дерево: габітус (форма крони) | прямий | 2 | |
| 4 | Однорічний пагін: за формою | прямий | 1 | |
| 5 | Однорічний пагін: міжвузля за довжиною | середні | 5 | |
| 6 | Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку | сіро-коричневе | 2 | |
| 7 | Однорічний пагін: кількість сочевичок | середня | 5 | |
| 8 | Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок | гостра | 1 | |
| 9 | Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона | слабко відхилені | 2 | |
| 10 | Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу | середній | 5 | |
| 11 | Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту) | помірне | 5 | |
| 12 | Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина) | помірна | 5 | |
| 13 | Листкова пластинка: положення відносно пагона | горизонтальне | 2 | |
| 14 | Листкова пластинка: за довжиною | довга | 7 | |
| 15 | Листкова пластинка: за шириною | широка | 7 | |
| 16 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина | велике | 7 | |
| 17 | Листкова пластинка: форма основи | рівна | 4 | |
| 18 | Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика) | гостра | 1 | |
| 19 | Листкова пластинка: кінчик за довжиною | середній | 5 | |
| 20 | Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини) | цілісна | 1 | |
| 21 | Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною | середні | 5 | |
| 22 | Листкова пластинка: вигин центральної жилки | помірний | 5 | |
| 23 | Черешок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 24 | Черешок: прилистки | відсутні | 1 | |
| 25 | Прилистки: відстань від основи черешка | ознака не визначалась | 0 | |
| 26 | Пагін: розташування квіткової бруньки | головним чином на довгих пагонах | 2 | |
| 27 | Квіткова брунька: за довжиною | середня | 5 | |
| 28 | Чашолисток: за довжиною | середній | 5 | |
| 29 | Чашолисток: положення відносно віночка | горизонтальне | 2 | |
| 30 | Квітка: положення країв пелюсток | перекриваються | 3 | |
| 31 | Приймочка: розташування відносно пияків | вище (довгий стовпчик) | 3 | |
| 32 | Квітка: розмір пелюстки | середній | 5 | |
| 33 | Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть) | широкоюйцеподібна | 2 | |
| 34 | Квітка: форма основи пелюстки (як для 33) | округла | 2 | |
| 35 | Квітка: нігтик за довжиною | середній | 5 | |
| 36 | Нестиглий плід: забарвлення чашолистків | коричневе | 3 | |
| 37 | Плід: за довжиною | короткий | 3 | |
| 38 | Плід: максимальний діаметр | великий | 7 | |
| 39 | Плід: відношення довжина / діаметр | мале | 3 | |
| 40 | Плід: місце максимального діаметра | ближче до чашечки | 2 | |
| 41 | Плід: за розміром | великий | 7 | |
| 42 | Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі) | злегка асиметричний | 2 | |
| 43 | Плід: профіль боків | опуклий | 3 | |
| 44 | Плід: основне забарвлення шкірки | зелене | 2 | |
| 45 | Плід: відносне поширення основного забарвлення | помірне | 5 | |
| 46 | Плід: відтінок основного забарвлення | рожево-червоний | 3 | |
| 47 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків | велике | 7 | |
| 48 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках | середнє | 5 | |
| 49 | Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки | відсутнє або дуже мале | 1 | |
| 50 | Плід: плодоніжка за довжиною | середня | 5 | |
| 51 | Плід: плодоніжка за товщиною | середня | 5 | |
| 52 | Плід: викривлення плодоніжки | слабке | 3 | |
| 53 | Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду | під нахилом | 2 | |
| 54 | Плід: заглиблення лійки плодоніжки | середнє | 5 | |
| 55 | Плід: положення чашолистків (за досягання) | розкриті | 3 | |
| 56 | Плід: блюдце (як для 55) | наявне | 9 | |
| 57 | Плід: заглиблення блюдця (як для 55) | середнє | 5 | |
| 58 | Плід: блюдце за шириною (як для 55) | середнє | 5 | |
| 59 | Плід: форма зони навколо блюдця | рельєфна | 3 | |
| 60 | Плід: структура м'якоті | крупнозерниста | 7 | |
| 61 | Плід: твердість м'якоті | м'яка | 3 | |
| 62 | Плід: соковитість м'якоті | соковита | 7 | |
| 63 | Насінина: форма | яйцеподібна | 2 | |
| 64 | Час початку цвітіння | середній | 5 | |
| 65 | Час збиральної стиглості | пізній | 7 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня урожайність сорту становить 28,97 т/га, середній урожай з дерева – 43,5 кг. Маса плоду середня – 300 г, максимальна – 450 г. Вміст вітаміну С – 1,7 мг%, загального цукру – 10,5%, сухої речовини в плодах – 13,2%, загальна кислотність – 0,2%. Стійкість до ураження борошнистою росою та паршею – 9 балів, стійкість до пошкодження плодожеркою – 7 балів. Зимостійкість – 5 балів, посухостійкість – 7. Ступінь підмерзання та вимерзання квіткових бруньок – 3 бали. Дегустаційна оцінка – 8 балів, транспортабельність – 9 балів. Група стиглості – осіння.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.