

Описи сортів рослин та показники господарської придатності

Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 22023002 Назва сорту: Іконік **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата пріоритету: 21.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 15.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240121

Орган, що провів випробування: Instance Nationale des Obtentions Vegetales (INOV), FR

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший fertильний вузол включно)	дуже велика	9	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	від помірної до сильної	6	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочек: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочек: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочек: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочек: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочек: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	вузький	3	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	від середньої до довгой	6	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	від помірної до щільної	6	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	бліле	1	
28	Квітка: парус за ширину	від широкого до дуже широкого	8	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	ознака не визначалась	0	
31	Квітка: чахолисток за ширину	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чахолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	довга	7	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	довга	7	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	короткий	3	
38	Біб: за ширину	вузький	3	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тула	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	мала	3	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насіння: форма	еліптична	1	
49	Насіння: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насіння: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насіння: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насіння: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіння: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насіння: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
56	Лише сорти з антоциановим забарвленням. Насіння: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	відсутня	1	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	5,9
2	Вміст білка, %	28,3
3	Тривалість періоду вегетації, діб	125
4	Придатність до механізованого збирання, бал (1–9)	9
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кореневі гнилі (<i>Pythium de Baryanum</i> Hesse, <i>Botrytis cinerea</i> Pers., <i>Hypochnus solani</i> Prill. et Del.)	7
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora pisi</i> Syd.)	6
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta pisi</i> Libert.)	7
8	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горохова зернівка (брухус) (<i>Bruchus pisorum</i> L.)	6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.