

**Вид:** Буряк кормовий *Beta vulgaris* L.

**Заявка № 15166001 Назва сорту:** Рубікон **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.01.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180004**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Клубочок: тип ростковості	одноростковий	1
2	Плоідність	диплоїд	2
3	Гіпокотиль: забарвлення	червоно-пурпурове	7
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (черешок включно)	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
8	Листкова пластинка: зелене забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: забарвлення жилок	червоне	5
10	Листкова пластинка: форма верхівки	тупа	3
11	Черешок: за довжиною	середній	5
12	Черешок: забарвлення основи	червоне	3
13	Коренеплід: форма	яйцеподібна	3
14	Коренеплід: за довжиною	середній	5
15	Коренеплід: за шириною	середній	5
16	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
17	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5
18	Коренеплід: забарвлення шкірки над поверхнею ґрунту	червоне	5
19	Коренеплід: забарвлення шкірки у ґрунті	червоне	7
20	Коренеплід: вміст сухої речовини	високий	7

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли держреєстрацію за 5 попередніх років, ц/га	68,9	70,2	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	18,6	13,0	
Урожайність сухої речовини, ц/га	108,0	70,7	
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, ц/га	39,1	0,5	
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %	57	0,7	
Середня маса коренеплода, г	806,1	713,4	
Вміст сухої речовини, %	15,4	15,2	
Тривалість періоду вегетації, діб	150	160	
Ступінь заглиблення в ґрунт, бал	5,6	5,0	
Густота стояння тис. шт/га	81	72,7	
Придатність до механізованого збирання, бал	7,6	4,2	
Цвітущість, %	0	1,8	
Стійкість проти довгоносиків, бал	8,4	6,6	
Стійкість проти церкоспорозу, бал	7	5,8	
Ураженість коренідом, бал	1	2,6	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.