

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 23088005 Назва сорту: Пондус Заявник (код): 723 Власник сорту (код): 723

Дата пріоритету: 31.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.09.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230574

Орган, що провів випробування: Naktuinbouw

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|---|-----|----------|
| 1 | Світловий паросток: розмір | від середнього до великого | 6 | |
| 2 | Світловий паросток: форма | яйцеподібна | 2 | |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | від помірної до сильної | 6 | |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | відсутнє або дуже мале | 1 | |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | помірне | 5 | |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | мала | 3 | |
| 7 | Світловий паросток: форма верхівки | закрита | 1 | |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | від слабкого до помірного | 4 | |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | слабке | 3 | |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | мало | 3 | |
| 11 | Світловий паросток: бічні пагони за довжиною | короткі | 3 | |
| 12 | Рослина: тип розвитку | листяний | 3 | |
| 13 | Рослина: габітус | від напіврозлогого до розлогого | 6 | |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | від відсутнього або дуже слабкого до слабкого | 2 | |
| 15 | Листок: загальний розмір | від середнього до великого | 6 | |
| 16 | Листок: за відкритістю | від закритого до проміжного | 2 | |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | від помірного до сильного | 6 | |
| 18 | Листок: зелене забарвлення | від світлого до помірного | 4 | |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 20 | Друга пара бічних листочків: за шириною | середні | 5 | |
| 21 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | відсутні або дуже рідко | 1 | |
| 24 | Рослина: рясність цвітіння | від обрідного до помірного | 4 | |
| 25 | Суцвіття: розмір | від малого до середнього | 4 | |
| 26 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 27 | Віночок квітки: розмір | середній | 5 | |
| 28 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку | відсутнє або дуже слабка | 1 | |
| 29 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | ознака не визначається | 0 | |
| 30 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Рослина: час досягання | від раннього до середнього | 4 | |
| 32 | Бульба: форма | овальна | 3 | |
| 33 | Бульба: вічка за глибиною | мілкі | 3 | |
| 34 | Бульба: забарвлення шкірки | жовте | 2 | |
| 35 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 | |
| 36 | Бульба: забарвлення м'якоті | помірно жовте | 4 | |

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

| № з/п | Показник | Значення |
|-------|--|--------------|
| 1 | Загальна урожайність, т/га | 64,9 |
| 2 | Середня маса товарної бульби, г | 120 |
| 3 | Тривалість періоду вегетації, діб | 90 |
| 4 | Посухостійкість, бал (1–9) | 7 |
| 5 | Лежкість, % | 70 |
| 6 | Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фітофтороз (<i>Phytophthora infestans</i> D.B.) | 5 |
| 7 | Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вірусні захворювання | 7 (virus Y) |
| 8 | Стойкість проти збудників хвороб, бал (1–9): рак (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb) Perc.) | 9 (WR1, WR6) |
| 9 | Стойкість проти шкідників, бал (1–9): колорадський жук (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say) | 4 |
| 10 | Стойкість проти шкідників, бал (1–9): картопляна нематода (<i>Nematoda</i>) | 9 (Ro1, Ro4) |
| 11 | Вміст сухої речовини, % | 17,6 |
| 12 | Вміст крохмалю, % | 11,9 |
| 14 | Товарність, % | 90 |
| 13 | Напрямок використання | стл |
| 15 | Вміст редукованих цукрів, % | 0,00 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.