

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка № 24045037 Назва сорту:** Арієтта **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564**Дата пріоритету:** 22.11.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 30.12.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 241033**Орган, що провів випробовування:** Bundesamt fur Ernährungssicherheit, AT**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричнєве	2	
6	Рослина: за висотою	від середнього до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	від середнього до великого	6	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	від помірної до сильної	6	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягання	дуже ранній	1	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	4,3
2	Веgetаційний період, діб	94
3	Стійкість до вилягання, балів (1–9)	8
4	Стійкість до обсипання, балів (1–9)	8
5	Стійкість до посухи, балів (1–9)	7
6	Висота прикріплення нижнього бобу, см	13
7	Стійкість до хвороб, балів (1–9): аскохітоз	7
8	Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз	8
9	Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз	7
10	Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): бобова вогнівка	8
11	Вміст олії в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	22,3
12	Вміст білка в насінні (в перерахунку на суху речовину), %	42,1
13	Напрямок використання	корм, х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.