

**Вид:** Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

**Заявка № 15101004 Назва сорту:** Телержі **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 13.02.2018 **Патент № 180084**

**Дата пріоритету:** 02.11.2015

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.05.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170801**

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямe	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	середній	5
7	Листок: відношення ширини/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1
13	Листок: пухирчатість	помірна	5
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвильисттість краю	помірна	5
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	бліувате	1
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стигlosti	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	бліле	1
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5
28	Чоловіча стерильність	повна	3

#### За інформацією наданою заявником:

##### - показники господарської придатності

Загальна врожайність – 72 т/га, товарна врожайність – 65 т/га, період від повних сходів до початку достигання – 80 діб, період плодоношення – 15 діб, вміст білка – 2,0 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.