

**Вид:** Люцерна мінлива *Medicago x varia Martyn***Заявка №** 20364005 **Назва сорту:** Синьооке диво **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата пріоритету:** 01.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.01.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250006**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітурес осені першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	низька	3	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість до <i>Acyrhosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість до <i>Theroaphis maculata</i>	наявна	9	

**За інформацією, наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,39. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 6,52. Вміст білка, % – 17,3; клітковини, % – 32,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8; пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8; іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8; чорна плямистість стебел – 8; аскохітоз – 7; бура плямистість – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.