

# Описи сортів рослин та показники господарської придатності

## Descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

**Вид:** Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

**Заявка № 24009010 Назва сорту:** БЦ415 **Заявник (код):** 2479 **Власник сорту (код):** 2479

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.02.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240080**

**Орган, що провів випробування:** Croatian Agency for Agriculture and Food, HR

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
5	Листок: кут між листковою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	від ледь похилого до помірно похилого	4	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
11	Волоть: антоціанове забарвлення піляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	від малого до середнього	4	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	від ледь похилого до помірно похилого	4	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	від відсутнього або дуже слабкого до слабкого	2	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	від середньої до довгої	6	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	від короткої до середньої	4	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлускним типом зернівки. Рослина: за довжиною	від середньої до довгої	6	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	від великого до дуже великого	8	
26	Листок: пластинка за ширину	дуже широка	9	
27	Качан: ніжка за довжиною	від дуже короткої до короткої	2	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	від малого до середнього	4	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	від середньої до великої	6	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	від слабкого до помірного	4	

### Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га	12
2	ФАО	340
3	Вихід зерна, %	85
4	Вміст крохмалю, %	73,1
5	Вміст білка, %	10,1
6	Висота рослини, см	220
7	Висота прикріплення нижнього розвиненого (з зерном) качана, см	110
8	Стійкість до посухи, бал (1–9)	8
9	Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): іржа ( <i>Puccinia maydis</i> Ber.)	5
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): летюча сажка ( <i>Sphacelotheca reiliana</i> (J.G.Kuhn) G.P. Clinton.)	6
11	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пухирчаста сажка ( <i>Ustilago maydis</i> (Persoon) Rousset)	7
12	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз ( <i>Fusarium moniliforme</i> var. <i>subglutinans</i> Wollenb. et Reinking)	7
13	Стійкість до хвороб, бал (1–9): гельмінтоспоріоз	7
14	Стійкість проти шкідників, бал (1–9): метелик кукурудзяний ( <i>Ostrinia nubilalis</i> Hubner)	7

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.