

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 23009010 Назва сорту: Дебют Заявник (код): 2260 921 Володілець патенту (код): 921 2260

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.02.2025 Патент № 250085

Дата пріоритету: 20.01.2023

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|--|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Перший листок: антоціанове забарвлення піхви | сильне | 7 | |
| 2 | Перший листок: форма верхівки | округла | 3 | |
| 3 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 2 | |
| 4 | Листок: хвилястість краю пластинки | помірна | 2 | |
| 5 | Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом | малий | 3 | |
| 6 | Листок: положення пластинки у просторі | ледь похиле | 3 | |
| 7 | Стебло: зигзагоподібність | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 8 | Волоть: час цвітіння | ранній | 3 | |
| 9 | Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски | слабке | 3 | |
| 10 | Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи | слабке | 3 | |
| 11 | Волоть: антоціанове забарвлення пиляків | слабке | 3 | |
| 12 | Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками | середній | 5 | |
| 13 | Волоть: положення бічних гілочок у просторі | помірно похиле | 5 | |
| 14 | Волоть: кількість первинних бічних гілочок | мала | 3 | |
| 15 | Качан: час появи шовку | від раннього до середнього | 4 | |
| 16 | Качан: антоціанове забарвлення шовку | слабке | 3 | |
| 17 | Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів | помірне | 5 | |
| 18 | Волоть: розташування колосків за щільністю | середньої щільності | 5 | |
| 19 | Листок: антоціанове забарвлення піхви | слабке | 3 | |
| 20 | Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів | слабке | 3 | |
| 21 | Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) | довга | 7 | |
| 22 | Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки) | середня | 5 | |
| 23 | Волоть: бічна гілочка за довжиною | середня | 5 | |
| 24,1 | Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 24,2 | Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною | дуже довга | 9 | |
| 25 | Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини | мале | 3 | |
| 26 | Листок: пластинка за шириною | широка | 7 | |
| 27 | Качан: ніжка за довжиною | коротка | 3 | |
| 28 | Качан: за довжиною | середній | 5 | |
| 29 | Качан: діаметр (посередині) | дуже великий | 9 | |
| 30 | Качан: форма | конусно-циліндрична | 2 | |
| 31 | Качан: кількість зернових рядів | середня | 5 | |
| 32 | Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору | ознака не визначається | 0 | |
| 34 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 36 | Качан: тип зернівки | зубовидний | 5 | |
| 37 | Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок | ознака не визначається | 0 | |
| 38 | Качан: забарвлення верхівки зернівки | жовто-оранжеве | 4 | |
| 39 | За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок | жовто-оранжеве | 4 | |
| 40 | Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня | сильне | 7 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 6,09 | 8,55 | 7,42 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 5,05 | 8,92 | 7,87 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | -1,04 | 0,37 | 0,45 |
| +, - до усередненої урожайності, % | -17,1 | 4,3 | 6,1 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,12 | 0,06 | 0,08 |
| Тривалість періоду вегетації, дб | 111 | 117 | 115 |
| Висота рослини, см | 213,3 | 240,8 | 247,6 |
| Вихід зерна, % | 84,9 | 82,6 | 84,3 |
| Висота прикріплення качана, см | 85,7 | 92,3 | 96,3 |
| Відсоток рослин з пониклими качанами, % | 46,2 | 13,6 | 11,5 |
| Вирівняність за висотою прикріплення нижнього качана, см | 4,6 | 4,9 | 2,7 |
| Вміст білка, % | 9,8 | 8,9 | 8,3 |
| Вміст крохмалю, % | 72,4 | 72,7 | 72,7 |
| Стійкість до посухи, бал | 4 | 8 | 8 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти пухирчастої сажки, бал | 9 | 9 | 8 |
| Стійкість проти стеблової гнилі, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти метелика кукурудзяного, бал | 7 | 7 | 4 |
| Стійкість проти гельмінтоспорозю, бал | 9 | 9 | 7 |
| Група стиглості (FAO) | 2 | 2 | 2 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.