

**Вид:** Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

**Заявка № 24115043 Назва сорту:** Васмія **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Володілець патенту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.02.2025 **Патент №** 250108

**Дата пріоритету:** 03.12.2024

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 07.02.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250122

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код | Примітка |
|----|--|------------------------|-----|----------|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотыля   | наявне                 | 9   |          |
| 2  | Рослина: тип розвитку  | індетермінантний       | 2   |          |
| 3  | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)          | ознака не визначається | 0   |          |
| 4  | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині  | слабке                 | 3   |          |
| 5  | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям                                 | середнє                | 5   |          |
| 6  | Листок: положення (у середній третині рослини)   | напівпоникле           | 7   |          |
| 7  | Листок: за довжиною  | середній               | 5   |          |
| 8  | Листок: за шириною   | середній               | 5   |          |
| 9  | Листок: за розсіченістю  | двічі перистий         | 2   |          |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)   | середній               | 5   |          |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                | 5   |          |
| 12 | Листок: глянуватість (як для б)  | слабка                 | 3   |          |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для б)   | слабка                 | 3   |          |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для б)  | малий                  | 3   |          |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі  | піднесене              | 3   |          |
| 16 | Суцвіття: за типом   | переважно не галузисте | 1   |          |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)  | відсутня               | 1   |          |
| 18 | Квітка: опушення приймочки маточки   | наявне                 | 9   |          |
| 19 | Квітка: забарвлення  | жовте                  | 1   |          |
| 20 | Квітконіжка: відокремлюючий шар  | наявний                | 9   |          |
| 21 | Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | коротка                | 3   |          |
| 22 | Плід: розмір   | великий                | 7   |          |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра   | мале                   | 3   |          |
| 24 | Плід: форма поздовжнього розрізу   | сплюснута              | 2   |          |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки  | слабка                 | 3   |          |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу   | кругляста              | 2   |          |
| 27 | Плід: заглиблення біля плодоніжки  | помірне                | 5   |          |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки  | середній               | 5   |          |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця  | середній               | 5   |          |
| 30 | Плід: форма кінця плоду  | плеската               | 3   |          |
| 31 | Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі   | великий                | 7   |          |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною   | середній               | 5   |          |
| 33 | Плід: кількість наслідних камер  | більше шести           | 5   |          |
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням)  | відсутнє               | 1   |          |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)   | дуже малий             | 1   |          |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)  | слабка                 | 3   |          |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)                              | помірна                | 5   |          |
| 38 | Плід: забарвлення (за досягання)   | червоне                | 5   |          |
| 39 | Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)   | червоне                | 5   |          |
| 40 | Плід: за твердістю   | помірний               | 5   |          |
| 41 | Плід: термін лежкості  | помірний               | 5   |          |
| 42 | Час цвітіння   | ранній                 | 3   |          |
| 43 | Час досягання  | середній               | 5   |          |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання)  | середній               | 5   |          |
| 45 | Чутливість до сріблястості   | несприятливий          | 1   |          |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>  | наявна                 | 9   |          |
| 48 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum f. sp. radices lycopersici</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 50 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum (Fulvia fulva)</i>  | наявна                 | 9   |          |
| 51 | Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 53 | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium spp.</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>   | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 57 | Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>   | відсутня               | 1   |          |
| 58 | Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>   | наявна                 | 9   |          |
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>  | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>   | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 61 | Стійкість проти <i>Tomato torrado virus (ToTV)</i>   | ознака не визначалась  | 0   |          |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою  | висока                 | 7   |          |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед досяганням)  | відсутні               | 1   |          |

| №  | Ознака                    | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---------------------------|------------|-----|----------|
| 64 | Плід: глянуватість шкірки | помірна    | 2   |          |
| 65 | Плід: епідерміс           | жовтий     | 2   |          |

**За інформацією, наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 121. Вміст каротину, мг% – 6,6; сухої речовини в плоді, % – 6,3; вітаміну С, мг% – 7,0; загального цукру, % – 5,7. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 200. Період від повних сходів до початку дозрівання, днів – 102. Тривалість періоду плодоношення, днів – 85.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.