

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 24012049 Назва сорту: Понтіформ **Заявник (код):** 2552 **Підтримувач сорту (код):** 2552

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 27.09.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240557

Орган, що провів випробовування: Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, CZ

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|-------------------------------|-----|----------|
| 1 | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | від помірної до сильної | 6 | |
| 2 | Рослина: габітус (форма куща) | розлогий | 7 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 4 | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком | мала | 3 | |
| 5 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | пізній | 7 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | від сильного до дуже сильного | 8 | |
| 7 | Колос: восковий наліт | від помірного до сильного | 6 | |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | сильний | 7 | |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | від низької до середньої | 4 | |
| 10 | Соломина: виловнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виловнена | 3 | |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | веретенооподібна | 5 | |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців) | від короткого до середнього | 4 | |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні зубці | 2 | |
| 15 | Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною | середні | 5 | |
| 16 | Колос: забарвлення | біле або солом'яно-жовте | 1 | |
| 17 | Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла | від помірного до сильного | 6 | |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за ширину (колосок у середині колоса) | середнє | 5 | |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою вершини | піднесене з наявністю другої | 5 | |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною | короткий | 3 | |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою | середньо зігнутий | 5 | |
| 22 | Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні | від слабкого до помірного | 4 | |
| 24 | Зернівка: забарвлення | червоне | 2 | |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | від темного до дуже темного | 8 | |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 34 | Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні | відсутнє | 1 | |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки | сильний | 7 | |

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

| № з/п | Показник | Значення |
|----------|---|----------|
| 1 | Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га | 8 |
| 2 | Висота рослини, см | 106 |
| 3 | Вегетаційний період, діб | 270 |
| 4 | Маса 1000 зерен, г | 51 |
| 5 | Зимостійкість, балів (1–9) | 6 |
| 6 | Критична температура вимерзання, °C | -20 |
| 7 | Стійкість до вилягання, балів (1–9) | 7 |
| 8 | Стійкість до посухи, балів (1–9) | 7 |
| 9 | Натура зерна, г/л | 759 |
| 10 | Вміст білка, % | 14,5 |
| 11 | Вміст сирої клейковини, % | 21 |
| 12 | Показник альвеографа (W), о. а. | 294 |
| 13 | Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл | 686 |
| 14 | Напрям використання | зерновий |
| 15 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): кореневі гнилі | 8 |
| 16 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса | 7 |
| 17 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): бура листкова іржа | 7 |
| 18 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): лінійна або стеблова іржа | 7 |
| 19 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): септоріоз | 7 |
| 20 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): фузаріоз колоса | 7 |
| 21 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): тверда сажка | 7 |
| 22 | Стійкість до хвороб, балів (1–9): летюча сажка | 6 |
| 23 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): внутрішностеблові | 7 |
| 24 | Стійкість до заселення (пошкодження) шкідниками, балів (1–9): клоп-черепашка | 6 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.