

забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 69,8 ц/га, гарантований приріст складає 3 ц/га. Стійкість до засухи 6,9 балів, вилягання - 8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,3%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3%, білка 8,9%.

## ⑧ 06004061 Кредит МВ

Заявник:

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви первого листка - сильне. Зигзагоподібність стебла - слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - помірне. Волоть щільне. Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - відсутня або дуже слабке. Рослина за довжиною (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів - середня (від 15 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовтий

Урожайність по зоні Степу 68,3 ц/га, гарантована прибавка складає - 3,6 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,1 %. Вміст крохмалю 72,5 %, білку 8,8 %.

Урожайність в умовах зрошення становить 111,6 ц/га, гарантована прибавка складає - 4 ц/га. Вихід зерна при обмолоті 82,3 %.

## 07004131 Кріспі

Заявник:

Майсадур Семанс

Форма верхівки первого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви первого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі під похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи - слабке. Волоть щільності. Час появи "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною "шовку" - помірна. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (19-22 см). Тип зернини кременістоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 82,8 ц/га, гарантований приріст складає 16 ц/га. Стійкість до засухи 8,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 78,7%. Вміст крохмалю - 72,9%, білка 9,8%.

## 06004065 Командос

Заявник:

КВС ЗААТ АГ

Форма верхівки первого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви первого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільності. Час появи "шовку" - слабке. Рослина за довжиною (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною "шовку" - слабке. Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (19-22 см). Тип зернини кременістоподібний, за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий,