

слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,3 ц/га, гарантований приріст складає 14 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,5%. Вміст крохмалю відповідно - 73,5%, білка 9,8%.

07004122 Кларіті

Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,5 ц/га, гарантований приріст складає 14 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 85,0 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,6%, білка 10,1%.

® 07004062 Квітневий 187 MB

Степ, Полісся

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 77,8 ц/га, Полісся - 82,9 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 18 ц/га та 2 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 80,2 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,4% та 73,2%, білка 9,5% та 9,8%.

07004070 Каріфолс

Степ, Лісостеп

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - від сильного до дуже сильного. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - дуже слабе. Час повного цвітіння (

середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 84,6 ц/га, Лісостепу - 90,8 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 19,8 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,2 ц/га. Стійкість до засухи 8,3-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 83,0-78,7 %. Вміст крохмалю 74,4-72,6 %, білку 8,5-9,7 %.

® 07004129 ЛГ3285

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,0 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

® 06004068 Липовець 225 MB

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - від округленої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - сильне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 78,1 ц/га, Полісся - 90,6 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 11,3 ц/га, та 7 ц/га. Стійкість до засухи 8,5-8,8 балів, вилягання - 8,8-9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,6%, Полісся - 73,7 %. Вміст крохмалю відповідно - 72,5% та 73,2%, білка 9,1%.

06004057 ЛГ3475

Заявник: Лімагрейн Юроп

Степ