

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 83,1ц/га, гарантований приріст складає 1,0 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,8%. Вміст крохмалю відповідно - 72,4%, білка 9,7%.

08004019 Леона

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - від помірного до сильного. Зигзагоподібність стебла - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від слабого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - від слабої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - від довгої до дуже довгої. Ніжка качана за довжиною - від короткої до середньої. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,5 ц/га, гарантована прибавка 16,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,6 %. Вміст крохмалю 71,4 %, білку 10,0 %.

08004024 Лотар

Степ

Заявник: Панама Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Положення листкової пластинки у просторі - сильно похиле. Зигзагоподібність стебла - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабе. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - червоно-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.