

Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірне.

Урожайність по зоні Степу - 76,8 ц/га, Лісостепу - 82,5 ц/га, гарантований приріст відповідно складає 17 ц/га та 2,5 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,7%, Лісостепу - 78,4%. Вміст крохмалю відповідно - 72,1% та 73,3%, білка 9,2 та 9,9%.

08004011 Морісат

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

Урожайність по зоні Степу - 81,2 ц/га, гарантований приріст складає 14,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 79,7%. Вміст крохмалю відповідно - 70,8%, білка 10,1%.

08004026 Маді

Степ

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Положення листової пластинки у просторі - ледь похиле. Зигзагоподібність стебла - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - слабке. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабке. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 79,6 ц/га, гарантована прибавка складає - 17,9 ц/га. Стійкість до засухи 8,4 балів, вилягання 8,7 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 79,2 %. Вміст крохмалю 74,2 %, білку 9,5 %.

08004033 Мозаїк

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сарл Адрієн Момон і Сини

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабке. Зигзагоподібність стебла - слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабке. Волоть середньощільна. Час

появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кременистий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,5 ц/га, Лісостепу - 88,3 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 11,8 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 80,3-78,8-76,1 %. Вміст крохмалю 72,8-73,5-72,1 %, білку 9,1-9,4-10,4 %.

® 07004102 НС 2022

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 77,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 15,3 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 8,5 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,5 %. Вміст крохмалю 70,2 %, білку 10 %.

® 07004092 НС 444 Ультра

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабе. Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Положення листкової пластинки у просторі - похиле. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Волоть щільна. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – дуже пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – від довгої до дуже довгої (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною – від середнього до довгого. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 86,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 10,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,8 %. Вміст крохмалю 72,9 %, білку 9,7 %.

06004116 НК Сімба

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на