

появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини кремений, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,5 ц/га, Лісостепу - 88,3 ц/га, Полісся - 88,7 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 11,8 ц/га, в зоні Лісостепу - на рівні стандартів, в зоні Полісся - 2,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 80,3-78,8-76,1 %. Вміст крохмалю 72,8-73,5-72,1 %, білку 9,1-9,4-10,4 %.

® 07004102 НС 2022

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – середній. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 77,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 15,3 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 8,5 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,5 %. Вміст крохмалю 70,2 %, білку 10 %.

® 07004092 НС 444 Ультра

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - слабе. Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Положення листкової пластинки у просторі - похиле. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від пізнього до дуже пізнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – слабе. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - помірне. Волоть щільна. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані – дуже пізній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – від довгої до дуже довгої (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною – від середнього до довгого. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, низу зернини - жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 86,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 10,6 ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 79,8 %. Вміст крохмалю 72,9 %, білку 9,7 %.

06004116 НК Сімба

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на

качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,0 ц/га, Лісостепу - 96,2 ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 23,8-6,8- 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,8-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81%. Вміст крохмалю 71,2-73,1-73,6 %, білку 9,5 - 8,4 %.

® 07004014 НС 3014

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 92,4 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 27,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,3 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 80,2-77,1 %. Вміст крохмалю 73,0-73,2 %, білку 8,3-9,8 %.

® 07004015 НС 2016

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабка. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”-слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 75,7 ц/га, гарантована прибавка - 14 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,1%. Вміст крохмалю 73,2 %, білку 9,3 %.

06004119 НК Фортіус

Степ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла -сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі