

качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,0 ц/га, Лісостепу - 96,2 ц/га, Полісся - 88,8 ц/га, гарантована прибавка відповідно 23,8-6,8- 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,8-8,7 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 81%. Вміст крохмалю 71,2-73,1-73,6 %, білку 9,5 - 8,4 %.

® 07004014 НС 3014

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - дуже пізній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи - сильне. Інтенсивність антоціанового забарвлення основи колоскової луски - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від пізнього до дуже пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга (20,1 до 40 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 92,4 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 27,6 ц/га, в зоні Лісостепу - 2,3 ц/га. Стійкість до засухи 7,5-8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно 80,2-77,1 %. Вміст крохмалю 73,0-73,2 %, білку 8,3-9,8 %.

® 07004015 НС 2016

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”-слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 75,7 ц/га, гарантована прибавка - 14 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 84,1%. Вміст крохмалю 73,2 %, білку 9,3 %.

06004119 НК Фортіус

Степ

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла -сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі

волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,8ц/га, гарантований приріст складає 4,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%. Вміст крохмалю відповідно - 74,1%, білка 8,8%.

08004018 Нованія

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірне. Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Положення листової пластинки у просторі - сильно похиле. Зигзагоподібність стебла - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабе. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слаба. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 8,5 балів. Вихід зерна при обмолоті 77,8 %. Вміст крохмалю 76,6 %, білку 10,3 %.

07004093 НК Ігл

Степ, Лісостеп

Заявник: ТОВ "Сингента"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Зигзагоподібність стебла - слаба. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - від слабкої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - від короткої до середньої. Качан за формою циліндричний, за довжиною - від середньої до довгої. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,9 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу - 25,7 ц/га, в зоні Лісостепу - 1,5 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 82,7-80,1 %. Вміст крохмалю 73,6-71,4 %, білку 8,4-9,5 %.

07004095 НК Луціус

Степ