

волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 80,8ц/га, гарантований приріст складає 4,7 ц/га. Стійкість до засухи 8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 83,5%. Вміст крохмалю відповідно - 74,1%, білка 8,8%.

08004018 Нованія

Степ

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - помірне. Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатеподібної. Положення листової пластинки у просторі - сильно похиле. Зигзагоподібність стебла - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення колоскових лусок (за винятком основи) - помірне. Інтенсивність антоціанового забарвлення пиляків на середній третині головної осі волоті на щойно з'явлених пиляках - слабе. Волоть середньої щільності. Кут між головною віссю та бічними гілочками волоті - середній (26-50). Час появи шовку на качані - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слаба. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - від середньої до довгої. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, низу зернини - оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу 86,2 ц/га, гарантована прибавка складає - 21,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 8,5 балів. Вихід зерна при обмолоті 77,8 %. Вміст крохмалю 76,6 %, білку 10,3 %.

07004093 НК Ігл

Степ, Лісостеп

Заявник: ТОВ "Сингента"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Зигзагоподібність стебла - слаба. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від слабкого до помірного. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - від слабкої до помірної. Антоціанове забарвлення піхви листка - від відсутнього або дуже слабкого до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - від короткої до середньої. Качан за формою циліндричний, за довжиною - від середньої до довгої. Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу 87,9 ц/га, Лісостепу - 91,0 ц/га, гарантована прибавка складає в зоні Степу- 25,7 ц/га, в зоні Лісостепу - 1,5 ц/га. Стійкість до засухи 8-9 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 82,7-80,1 %. Вміст крохмалю 73,6-71,4 %, білку 8,4-9,5 %.

07004095 НК Луціус

Степ

Заявник: ТОВ "Сингента"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - пізній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - від середньої до широкої. Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 83,1 ц/га, гарантований приріст складає 16,5 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, вилягання - 8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 82,1%. Вміст крохмалю - 71,9%, білка - 8,4%.

07004096 НК Джитаго**Степ**

Заявник: ТОВ "Сингента"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Зигзагоподібність стебла - сильна. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слаба. Антоціанове забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною - середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини кремений, кількість зернових рядів - мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини - оранжевий.

Урожайність по зоні Степу 73,7 ц/га, гарантована прибавка складає - 12 ц/га, Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,7 %. Вміст крохмалю 71,6 %, білку 10,0 %.

07004097 НК Топ**Степ**

Заявник: ТОВ "Сингента"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від довгої до дуже довгої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

Урожайність по зоні Степу - 75,6 ц/га, гарантований приріст складає 9 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 84,9%. Вміст крохмалю - 72,0%, білка 9,7%.

07004099 НК Канзас**Степ**