

Урожайність по зоні Степу 93,9 ц/га, гарантована прибавка складає - 17,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,7 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білка 8,9 %.

08004003 Опока

Степ

Заявник: Ходовля Рослин Смоліце Сп.з.о.о Група ІХАР

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,9 ц/га, гарантований приріст складає 8,2 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,9%. Вміст крохмалю відповідно - 73,2%, білка 9,4%.

® 07004029 Остреч СВ

Степ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабе, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірно. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

Урожайність по зоні Степу - 80,5 ц/га, гарантований приріст складає 20,6ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,2%. Вміст крохмалю - 71,8%, білка 9,7%.

® 06004071 Оржиця 237 MB

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка - сильне. Зигзагоподібність стебла - відсутня або дуже слаба. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірно. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті - дуже сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слаба. Інтенсивність забарвлення піхви листка - відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) - середня. Ніжка качана за довжиною - середня (від 8,1 до 10,0 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів - середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини - жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.