

Урожайність по зоні Степу 93,9 ц/га, гарантована прибавка складає - 17,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,3 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,7 %. Вміст крохмалю 73,6 %, білку 8,9 %.

08004003 Опока

Степ

Заявник: Ходовля Рослин Смолице Сп.з.о.о Група IXAP

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 74,9 ц/га, гарантований приріст складає 8,2 ц/га. Стійкість до засухи 7,9 балів, вилягання - 8,7 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,9%. Вміст крохмалю відповідно - 73,2%, білка 9,4%.

® 07004029 Остреч СВ

Степ

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

Урожайність по зоні Степу - 80,5 ц/га, гарантований приріст складає 20,6ц/га. Стійкість до засухи 8,2 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті - 79,2%. Вміст крохмалю - 71,8%, білка 9,7%.

® 06004071 Оржиця 237 МВ

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – дуже сильне. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- слабка. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – середня. Ніжка качана за довжиною – середня (від 8,1 до 10,0 см). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною – короткий (15-18 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 75,9 ц/га, Лісостепу - 87,8 ц/га, гарантована прибавка по Степу 13,7 ц/га, в Лісостепу на рівні стандарту. Стійкість до засухи 7,5- 8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2-78,5 %. Вміст крохмалю 73,1 - 74,0 %, білку 9,2 - 8,6 %.

® **07004067 Олігарх МВ**

Степ

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- відсутнє або дуже слабке. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндрична, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 24,8 ц/га, Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,8 %. Вміст крохмалю 74,7 %, білку 8,8 %.

® **07004032 Полтава**

Степ

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірне. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабке. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабке. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 23,6 ц/га, Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 79,1 %. Вміст крохмалю 74,0 %, білку 9,8 %.

05004009 ПАН 240

Степ, Полісся

Заявник: Панам Франція САРЛ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабке. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - оранжевий, колір низу зернини - оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 78,7ц/га, Полісся - 88,8ц/га, гарантований приріст відповідно складає 16,5 - 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,4 -