

Урожайність по зоні Степу 75,9 ц/га, Лісостепу - 87,8 ц/га, гарантована прибавка по Степу 13,7 ц/га, в Лісостепу на рівні стандарту. Стійкість до засухи 7,5- 8,6 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9,0 балів. Вихід зерна при обмолоті 83,2-78,5 %. Вміст крохмалю 73,1 - 74,0 %, білку 9,2 - 8,6 %.

® 07004067 Олігарх МВ

Заявник:

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Степ

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – сильне. Зигзагоподібність стебла – слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла – слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – сильне. Волоть щільна. Час появи шовку на качані – від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- відсутнє або дуже слабе. Антоціанове забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою циліндрична, за довжиною – середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – середня (від 16 до 18 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – помірна.

Урожайність по зоні Степу 87,0 ц/га, гарантована прибавка складає - 24,8 ц/га, Стійкість до засухи 8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 76,8 %. Вміст крохмалю 74,7 %, білку 8,8 %.

® 07004032 Полтава

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича комерційна фірма "Селекта"

Інтенсивність антоціанового забарвлення піхви першого листка – помірна. Зигзагоподібність стебла – відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла –сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть нещільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку”- помірна. Інтенсивність забарвлення піхви листка – відсутнє або дуже слабе. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 85,8 ц/га, гарантована прибавка складає - 23,6 ц/га, Стійкість до засухи 8,1 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті, відповідно, 79,1 %. Вміст крохмалю 74,0 %, білку 9,8 %.

05004009 ПАН 240

Заявник:

Панам Франція САРЛ

Степ, Полісся

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірна. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини проміжний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 78,7ц/га, Полісся - 88,8ц/га, гарантований приріст відповідно складає 16,5 - 2,8 ц/га. Стійкість до засухи 7,4 -