

- середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - червоно-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

### 09004794 Дн 619

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листкової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть нещільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

### ® 09004487 ДВ03 ДВ48

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дужа слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - відсутнє.

### 09004572 К 15

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Маїс"

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - помірна. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини

жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

#### **09004573 К 4**

Заявник: Науково- виробниче фермерське господарство "Компанія "Maic"

Форма верхівки першого листка - від загостреної до округлої. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від середнього до пізнього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою циліндричний, за довжиною - середній (23-26 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовтий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.

#### **® 09004479 ЛІМНОТ21 ЛІМІВТ44**

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини кременистоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - помірна.

#### **® 09004503 ЛІММСІ29 ЛІМІВХ77**

Заявник: Лімагрейн Юроп

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - слабе. Положення листової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння ( середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною ( враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною ( аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слабка.