

Форма верхівки першого листка - від округлої до лопатоподібної. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Порознія плисткової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових пусок - відсутнє або дуже слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутнє. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листочок верхнього качана, см) - широка (від 10,1 до 12,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернинни жовто-оранжевий. Інтенсивність антоціанового забарвлення пусок стрижня - слабка.

у бурожайність по зоні Степу - 92,6 ц/га, гарантований приріст складає 10,4 ц/га. Стійкість до засухи 8,5 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,5%. Вміст крохмалю відповідно - 72,7%, білка 9,2%.

07004055 ΠΡ38Α79

Піонер Хай-Бред Світ зберігено

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листкової пластинки в простиорі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабке. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення основи колоскових лусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи - слабке. Волоть щільна. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довга (понад 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - довга. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - від дуже короткого до короткого. Тип зерничини пуховий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

рожайність по зоні Степу - 75,2 ц/га, гарантований приріст складає 8,7 ц/га. Стійкість до засухи 8,1 балів, вилігання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,5%. Вміст крохмалю відповідно - 71,9%, білка 9,3%.

07004057 MP37H01

Піонер Хай-Брел Світ земліни СА
Заявник:

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення основи колоскових пусок - відсутнє або дуже слабке, антоціанове забарвлення колоскових пусок за виключенням основи - слабке. Волоту середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - дуже довгва (понад 200 см). Пластинка листка за ширину (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубовий, кількість зернин в зернівниках - середня. Кількість зернин в зернівнику - середня.

Урожайність по зоні Степу - 90,3 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 23,7 ц/га та 1,0 ц/га. Стійкість до ураження саркосфізом - 83,8%, вилягання - 9-8,8 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 81,7%, Лісостепу - 73,8%. Вміст крохмалю відповідно - 73,3-73,2%, білка 9,0-9,9%.

07004058 ПР37Н54

264