

Заявник: Евраліс Семанс

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листкової пластинки в просторі ледь похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - не визначається. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - відсутнє або дуже слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - коротка. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - довгий (23-26 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів велика, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слаба.

® 09004030 P1129

Заявник: Суедвестсаат ГБР

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слабе. Положення листкової пластинки в просторі пряме. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - ранній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть середньої щільності. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - ранній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - від дуже короткої до короткої. Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - від середньої до довгої. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів від малої до середньої, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини червоно-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - слаба.

® 09004036 P7050

Заявник: Суедвестсаат ГБР

Форма верхівки першого листка - загострена. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - відсутнє або дуже слаба. Положення листкової пластинки в просторі від прямого до ледь похилого Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - відсутнє або дуже слабе. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - від відсутнього або дуже слабого до слабого. Волоть від середньої щільності до щільного. Час появи "шовку" (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку" - відсутня або дуже слаба. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - середня (від 126 до 150 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - вузька (від 6,1 до 8,0). Ніжка качана за довжиною - від довгої до дуже довгої. Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною - від короткого до середнього. Тип зернини зубовий, кількість зернових рядів від середньої до великої, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - від помірної до сильної.

® 09004281 Ук 1712 СВ