

® 07001008 Баритон

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно. Прилисток жовто-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, короткий, середньої ширини та малою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та відсутньою або дуже слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини, вузький, зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Середньостиглий. Вегетаційний період 81 - 92 дні. Рослини висотою 58 - 85 см. Маса 1000 насінин 231 - 236 г.

Посухоустійкий, досить стійкий до осипання та посухи.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,9 - 35,5 ц / га, що на 11,1 -- 26,5 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 55 - 60 ц / га.

Білка має 23,4 - 25,4 %.

Сорт інтенсивного типу, придатний до прямого комбайнування.

Аскохітозом та антракнозом уражується нижче стандартів.

Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

® 06001006 Веселик

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку. Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, відсутністю воскового нальоту на верхніх листочках, малим розміром, середніми довжиною та шириною, відсутньою зубчастістю.

Прилисток зеленого кольору помірної його інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутніми формою "кролячих вух" і воскового нальоту, має середні параметри і довжини, і ширини та помірну щільність плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.