

Горох посівний

Степ , Лісостеп, Полісся

® 07001008 Баритон

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток жовто-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, короткий, середньої ширини та малою щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та відсутньою або дуже слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини, вузький, зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Середньостиглий. Вегетаційний період 81 - 92 дні. Рослини висотою 58 - 85 см. Маса 1000 насінин 231 - 236 г.

Посухостійкий, досить стійкий до осипання та посухи.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,9 - 35,5 ц / га, що на 11,1 -- 26,5 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 55 - 60 ц / га.

Білка має 23,4 - 25,4 %.

Сорт інтенсивного типу, придатний до прямого комбайнування.

Аскохітозом та антракнозом уражується нижче стандартів.

Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

® 06001006 Веселик

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку. Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, відсутністю воскового нальоту на верхніх листочках, малим розміром, середніми довжиною та шириною, відсутньою зубчастістю.

Прилисток зеленого кольору помірної його інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутніми формою "кролячих вух" і воскового нальоту, має середні параметри і довжини, і ширини та помірну щільність плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, вигутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості. Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, широкий, зелений колір з помірною інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен і сім'ядолі жовтого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

® 07001005 Клеопатра

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору слабо інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має довжину від короткого до середнього, ширину від вузької до середньої та відсутню плямистість.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика середній.

Квітка з довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, з формою основи від піднесеної до прямої та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має кількість насінних зачатків від малої до середньої, середню довжину та ширину, від слабкої до помірно інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з наявною слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79 - 91 день. Рослини висотою 50 - 73 дні. Маса 1000 насінин 222 - 235 г.

Сорт посухостійкий, стійкий до осипання та полягання.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 - 1,4 млн. / га схожих насінин.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,7 - 31,6 ц / га, що на 10,5 - 20,3 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 65 ц / га.

Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого комбайнування.

Стійкий до пошкодження кореневими гнилями та аскохітозом. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується нижче стандартів.

Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

07001004 Оплот

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.