

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, вигутою формою основи та помірно інтенсивністю його хвилястості. Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, широкий, зелений колір з помірно інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен і сім'ядолі жовтого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

## ® 07001005 Клеопатра

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору слабо інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має довжину від короткого до середнього, ширину від вузької до середньої та відсутню плямистість. Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика середній.

Квітка з довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, з формою основи від піднесеної до прямої та помірно інтенсивністю хвилястості.

Біб має кількість насінних зачатків від малої до середньої, середню довжину та ширину, від слабкої до помірної інтенсивності зеленого колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з наявною слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79 - 91 день. Рослини висотою 50 - 73 дні. Маса 1000 насінин 222 - 235 г.

Сорт посухостійкий, стійкий до осипання та полягання.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 - 1,4 млн. / га схожих насінин.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,7 - 31,6 ц / га, що на 10,5 - 20,3 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 65 ц / га.

Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого для гнильями та аскохітозом.

Стійкий до пошкодження кореневими гнильями та аскохітозом. Гороховою плодожеркою та попелицею уражується нижче стандартів.

Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

## 07001004 Оплот

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

## Степ, Лісостеп, Полісся

## Степ, Лісостеп, Полісся