

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, вигутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості. Біб має середню кількість насінних зачатків, середню довжину, широкий, зелений колір з помірною інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина циліндричної форми, має просту форму крохмальних зерен і сім'ядолі жовтого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

® 07001005 Клеопатра

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Заатен-Уніон ГмбХ

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору слабо інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має довжину від короткого до середнього, ширину від вузької до середньої та відсутню плямистість.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика середній.

Квітка з довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, з формою основи від піднесеної до прямої та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має кількість насінних зачатків від малої до середньої, середню довжину та ширину, від слабкої до помірно інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та дуже слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з наявною слабкою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий. Вегетаційний період 79 - 91 день. Рослини висотою 50 - 73 дні. Маса 1000 насінин 222 - 235 г.

Сорт посухостійкий, стійкий до осипання та полягання.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,2 - 1,4 млн. / га схожих насінин.

За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 29,7 - 31,6 ц / га, що на 10,5 - 20,3 відсотки більше національних стандартів. Потенційна урожайність сорту 65 ц / га.

Сорт інтенсивного типу, придатний для прямого комбайнування.

Стійкий до пошкодження кореневими гнилями та аскохітозом. Гороховою плоджеркою та попелицею уражується нижче стандартів.

Придатний для поширення в зонах Степу, Лісостепу та Полісся

07001004 Оплот

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток блакитно-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, має середню довжину, вузький та дуже малою щільністю плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини та вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Вегетаційний період 80 - 93 дні. Сорт середньопізній. Рослини висотою 60 - 81 см. Маса 1000 насінин 246 - 250 г.

Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 30,2 - 32 ц / га, що на 16,1 - 16,9 відсотки більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 60 ц / га

Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.

Смакові якості і розварюваність добрі. Білка має 21,3 - 26 %.

Сорт стійкий до аскохітозу і борошнистої роси.

Придатний для поширення в зоні Степу, Лісостепу та Полісся.

07001003 Отаман

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору сильної інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має середню довжину від вузької до середньої ширину та наявну помірну щільність плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий з шириною між вузькою і середньою, слабкої інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий, дозріває за 79 - 92 дні. Рослини висотою 55 - 69 см. Маса 1000 насінин 226 - 234 г.

Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин. Придатний для прямого комбайнування.

Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 27,8 - 30,6 ц / га, що на 9,4 - 13,1 відсоток більше за національні стандарти.