

Прилисток блакитно-зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух", з восковим нальотом, має середню довжину, вузький та дуже малою щільністю плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків; середньої довжини та вузький, помірно зеленого кольору з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Вегетаційний період 80 - 93 дні. Сорт середньопізній. Рослини висотою 60 - 81 см. Маса 1000 насінин 246 - 250 г.

Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин. Агротехніка звичайна для зони вирощування.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 30,2 - 32 ц / га, що на 16,1 - 16,9 відсотки більше національних стандартів. Потенційна можливість сорту 60 ц / га

Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.

Смакові якості і розварюваність добрі. Білка має 21,3 - 26 %.

Сорт стійкий до аскохітозу і борошнистої роси.

Придатний для поширення в зоні Степу, Лісостепу та Полісся.

07001003 Отаман

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і досягання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та середньою кількістю вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору сильної інтенсивності та відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий без наявної форми "кролячих вух" з восковим нальотом, має середню довжину від вузької до середньої ширину та наявну помірну щільність плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вусика короткий.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, довгий з шириною між вузькою і середньою, слабкої інтенсивності зелений колір з наявною пергаментністю, увігнутим типом вигину та слабким ступенем його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Середньостиглий, дозріває за 79 - 92 дні. Рослини висотою 55 - 69 см. Маса 1000 насінин 226 - 234 г.

Інтенсивний. За даними заявника норма висіву 1,2 млн / га схожих насінин. Придатний для прямого комбайнування.

Сорт стійкий до вилягання, осипання та посухи.

Урожайний. За роки державного випробування на сортодослідних станціях отримали середній урожай 27,8 - 30,6 ц / га, що на 9,4 - 13,1 відсоток більше за національні стандарти.

Смакові якості і розварюваність добрі. Білка має 22,9 - 23,5 %.
Гороховою плодожеркою і попелицею пошкоджується нижче стандартів.
Придатний для поширення в зоні Степу, Лісостепу та Полісся

® 06001003 Стартер

Лісостеп , Полісся .

Заявник: Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають середній час цвітіння, і досягання .

Стебло нефасційоване, коротке та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірної його інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух", восковим нальотом, має середні параметри і довжини, і ширини та малу щільність плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю хвилястості.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, зелений колір з помірною інтенсивністю його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен, сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Тип розвитку ярий. Середньоранній, вегетаційний період - 80 - 94 дні. Рослини висотою 51 - 78 днів. Маса 1000 насінин 203 - 230 г. Придатний для механізованого збирання. Агротехніка звичайна для зони вирощування. За даними заявника норма висіву 1,1 - 1,2 млн / га схожих насінин.

Урожайний, За роки випробування отримали середній урожай на державних центрах експертизи сортів рослин - 34,8 - 36,3 ц / га, що на 11,2 - 15,6 відсотки більше національних стандартів.

Високобілковий, сирого протеїну має 23,1 - 26,5 %, збір білка з 1 га - 8,3 - 8,7 ц / га .

Стійкий проти полягання, осипання, посухи та корневих гнилей.

06001008 Факел

Степ , Лісостеп , Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича агрокорпорація "Степова"

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і досягання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток блакитно-зеленого кольору без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутніми формою "кролячих вух" і воскового нальоту, має такі параметри розміру: довгий і середньої ширини з помірною щільністю плямистості.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з малою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, наступні параметри розміру: довгий з середньою шириною, зелений колір сильної інтенсивності його прояву, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину та слабкий ступінь його прояву.

Насінина сферичної форми, має просту форму крохмальних зерен та сім'ядолі жовтого кольору з відсутньою зморшкуватістю. Чорне