

забарвлення рубчика відсутнє.  
Маса 1000 насінин – середня.

Тип розвитку ярий . Середньостиглий , вегетаційний період - 85 - 96 днів . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . Агротехніка звичайна для зони вирощування . За даними заявника норма висіву 1,1 - 1,2 млн / га схожих насінин . Рослинні висотою 48 - 75 см . Маса 1000 насінин 253 - 266 г .  
Урожайний . За роки випробування на державних центрах експертизи сортів рослин середня врожайність в зоні Степу 30,3 ц / га , Лісостепу - 33,7 ц / га , Полісі - 33,0 ц / га , що на 4,5 - 6,1 відсотки більше стандартів .  
Збір білка з 1 гектара - 7,2 - 7,7 ц / га . Смакові якості і розварюваність добри .  
Стійкий до осипання , кореневих гнилей та антракнозу .

## Квасоля звичайна

### ® 06087006 Веселка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослинні сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння , мають кущовий станкій тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє .

Листки дуже світло-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю . Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загострою верхівкою .

Суцвіття за повного цвітіння знаходитьться в листках .

Квітка має рожевий колір паруса і білий крил та середній розмір приквітка .

Біб (включно з гачком) – довгий з середньою шириною посередині та має форму поперечного перерузу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини візокрека до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірне звуження в сухому стані .  
Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, маса увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та загострену форму верхівки (за виключенням гачка) .

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином .  
Стигле насіння двокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною формою поперечного перерузу з середньою його шириною .

Основний колір насінини – червоний, переважаючий вторинний колір – коричневий з пістрявим його розподілом, зі слабким жилкуванням . Колір кільца навколо рубчика – відрізняється від фону насінини .  
Маса 1000 насінин – велика .

### ® 06087007 Несподіванка

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослинні сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотиля відсутнє .  
Листки дуже світло-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю . Середній листочок середнього розміру, має форму від трикутної до округлої з гострою верхівкою .

Суцвіття за повного цвітіння знаходитьться частково в листках .