

забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Тип розвитку ярий . Середньостиглий , вегетаційний період - 85 - 96 днів . Напівінтенсивного типу , придатний до механізованого збирання . Агротехніка звичайна для зони вирощування . За даними заявника норма висіву 1,1 - 1,2 млн / га схожих насінин . Рослини висотою 48 - 75 см . Маса 1000 насінин 253 - 266 г .

Урожайний . За роки випробування на державних центрах експертизи сортів рослин середня врожайність в зоні Степу 30,3 ц / га , Лісостепу - 33,7 ц / га , Поліссі - 33,0 ц / га , що на 4,5 - 6,1 відсотки більше стандартів .

Збір білка з 1 гектара - 7,2 - 7,7 ц / га . Смакові якості і розварюваність добрі.

Стійкий до осипання , корневих гнилей та антракнозу .

Квасоля звичайна

® 06087006 Веселка

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий сланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотилів відсутнє.

Листки дуже світло-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загострою верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться в листках.

Квітка має рожевий колір паруса і білий крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – довгий з середньою шириною посередині та має форму поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірне звуження в сухому стані.

Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та загострену форму верхівки (за виключенням гачка).

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Стигле насіння двокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною формою поперечного перерізу з середньою його шириною.

Основний колір насінини – червоний, переважаючий вторинний колір – коричневий з пістрявим його розподілом, зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – відрізняється від фону насінини.

Маса 1000 насінин – велика.

® 06087007 Несподіванка

Заявник: Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Рослини сорту середньої висоти з середнім часом цвітіння, мають кущовий несланкий тип росту, антоціанове забарвлення гіпокотилів відсутнє.

Листки дуже світло-зеленого кольору з помірною зморшкуватістю. Середній листочок середнього розміру, має форму від трикутної до округлої з гострою верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – короткий з малою шириною посередині та має серцевидну форму поперечного перерізу через насінину, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірно виражене звуження в сухому стані.

Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівки (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною форму поперечного перерізу з малою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – середня.

07087004 Отрада

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з середнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотилі відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.

Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та маленький розмір приквітка.

Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з наявною волокнистістю, включно з гачком короткої довжини з середньою шириною посередині, формою поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, має середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та помірне звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини з відсутнім або дуже слабким вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має округлі форми і поздовжнього розтину, і поперечного перерізу з середньою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – мала

® 07087005 Щедра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з пізнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотилі відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.