

Квітка має білий колір і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб (включно з гачком) – короткий з малою шириною посередині та має серцевидну форму поперечного перерізу через насінину, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами, гладеньку текстуру поверхні бобу та помірно виражене звуження в сухому стані.

Біб – світло-жовтого кольору з наявною волокнистістю, має увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівки (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – короткий з відсутнім або дуже слабким його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове зі слабким жилкуванням, має нирковидну форму поздовжнього розтину зі слабким ступенем його вигину, еліптичною формою поперечного перерізу з малою його шириною.

Колір насінини – білий зі слабким жилкуванням. Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – середня.

### 07087004 Отрада

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з середнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотилія відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.

Середній листочок середнього розміру, має округлу форму з коротко загостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та маленький розмір приквітка.

Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з наявною волокнистістю, включно з гачком короткої довжини з середньою шириною посередині, формою поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, має середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та помірне звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини з відсутнім або дуже слабким вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має округлі форми і поздовжнього розтину, і поперечного перерізу з середньою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – мала

### ® 07087005 Щедра

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Рослини сорту мають кущовий несланкий тип росту, середньої висоти з пізнім часом цвітіння, антоціанове забарвлення гіпокотилія відсутнє.

Листки темно-зеленого кольору зі слабкою зморшкуватістю.

Середній листочок середнього розміру, має від трикутної до округлої форми з вузькозагостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з відсутньою волокнистістю, короткої довжини включно з гачком та середньою його шириною посередині, має форму поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та відсутнє або дуже слабке звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини з середнім його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, а поперечного перерізу – еліптичну з середньою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – середня.

## Сільськогосподарські: круп'яні

### Гречка їстівна

07002001 Дев'ятка

Степ, Лісостеп

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі дрібні, мають ниркоподібну форму, зеленого забарвлення зі слабкої інтенсивності антоціановим забарвленням. Гіпокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом компактна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з середньою гіллястістю (4-6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла), стосовно висоти гілок, знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – слабо ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодоутворення, має багато вузлів у зоні галуження, середню висоту прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, червоного кольору. Опушення перших двох вузлів середнє.

Третій листок має довгий черешок, середні показники довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини зі слабо хвилястою поверхнею, стрілоподібною формою, має зелене забарвлення зі слабко вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабке опушенням жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, розташування яких відокремлене. Квітка має малиновий колір пиляків, овальну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконосом, вузько циліндричною формою середньої щільності та середньою довжиною.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – зонтик середньої довжини.

Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; має видовжену форму з середніми крилами, гострими ребрами, увігнутою формою граней, гострою формою верхівки та основою з видовженим