

Середній листочок середнього розміру, має від трикутної до округлої форми з вузькозагостреною верхівкою.

Суцвіття за повного цвітіння знаходиться частково в листках.

Квітка має білі кольори і паруса, і крил та середній розмір приквітка.

Біб – одного помірно зеленого кольору, гладенький, з відсутньою волокнистістю, короткої довжини включно з гачком та середньою його шириною посередині, має форму поперечного перерізу через насінину від еліптичної до яйцевидної, середнє відношення ширини впоперек до відстані між швами та відсутнє або дуже слабке звуження в сухому стані, увігнуту форму вигину зі слабким ступенем його увігнутості та форму верхівку (за виключенням гачка) від загостреної до тупої.

Гачок – середньої довжини з середнім його вигином.

Колір нестиглого насіння (на початку потовщення бобів) – світло-зелений.

Стигле насіння однокольорове, біле зі слабким жилкуванням, має форму поздовжнього розтину від округлої до еліптичної, а поперечного перерізу – еліптичну з середньою його шириною.

Колір кільця навкруг рубчика – однаковий з фоном насінини.

Маса 1000 насінин – середня.

Сільськогосподарські: круп'яні

Гречка їстівна

07002001 Дев'ятка

Степ, Лісостеп

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі дрібні, мають ниркоподібну форму, зеленого забарвлення зі слабкої інтенсивності антоціановим забарвленням. Гіпокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом компактна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з середньою гіллястістю (4-6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла), стосовно висоти гілок, знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – слабо ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодотворення, має багато вузлів у зоні галуження, середню висоту прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, червоного кольору. Опушення перших двох вузлів середнє.

Третій листок має довгий черешок, середні показники довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини зі слабо хвилястою поверхнею, стріловидною формою, має зелене забарвлення зі слабо вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабке опушення жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та видовженою формою її листочків, розташування яких відокремлене. Квітка має малиновий колір пиляків, овальну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконосом, вузько циліндричною формою середньої щільності та середньою довжиною.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – зонтик середньої довжини.

Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; має видовжену форму з середніми крилами, гострими ребрами, увігнутою формою граней, гострою формою верхівки та основою з видовженим

ступенем її вираження..

Оплодень на час наливу плоду – зеленого кольору з малиноюю облямівкою на ребрах, а за повного досягання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірною плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Степ - 18,9 ц/га, Лісостеп- 19,9 ц/га., . Вегетаційний період: Степ- 83дн, Лісостеп-95дн. Висота рослини: С-87,6см, Л-91,4см. Маса 1000зерен: С-29,2г, Л-29,6г..Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Степ - 16,5%, Лісостеп - 15,8%. крупність ядра: С - 52,5%, Л - 51,4%, плівчастість: С- 22,8%, Л-22,3%, вихід крупи: С- 75,3%, Л-75,6%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

07002002 Диколь

Полісся

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі середнього розміру, мають ниркоподібну форму зеленого кольору, слабкої інтенсивності антоціанове забарвлення. Гіпокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом еректоїдна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з сильною гіллястістю (більше 6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – середньо ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодоутворення, має багато вузлів у зоні галуження, низькі прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, блідо-зеленого кольору. Опушення перших двох вузлів сильне.

Третій листок має середні показники довжину черешка, довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини з хвилястою поверхнею, стрілоподібною формою, має зелене забарвлення зі слабо вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабе опушенням жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та овальною формою її листочків, розташування яких дотичне. Квітка має малиновий колір пиляків, грибоподібну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконос, вузькоциліндрична форма середньої щільності, довге.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – китиця середньої довжини.

Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; видовженої форми з середніми крилами, гострими ребрами та гострою формою верхівки.

Форма граней плоду – увігнута, верхівка – гостра з видовженим ступенем вираження основи.

Оплодень на час наливу плоду блідо-зеленого кольору, а за повного досягання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірною плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Полісся - 15,7ц/га. Вегетаційний період: Полісся-100 дн.. Висота рослини: П-91,4см. Маса 1000зерен: П-27,6г.Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Полісся - 15,0%, крупність ядра: П- 38,3%, плівчастість: П-24,2%, вихід крупи: П-72,5%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.