

ступенем її вираження..

Оплодєнь на час наливу плоду – зеленого кольору з малиновою облямівкою на ребрах, а за повного досягання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірно плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Степ - 18,9 ц/га, Лісостеп- 19,9 ц/га., . Вегетаційний період: Степ- 83дн, Лісостеп-95дн. Висота рослини: С-87,6см, Л-91,4см. Маса 1000зерен: С-29,2г, Л-29,6г..Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Степ - 16,5%, Лісостеп - 15,8%. крупність ядра: С - 52,5%, Л - 51,4%, плівчастість: С- 22,8%, Л-22,3%, вихід круп: С- 75,3%, Л-75,6%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.

07002002 Дикуль

Полісся

Заявник: ВНДІ зернобобових і круп'яних культур

Сорт диплоїдний. Сім'ядолі середнього розміру, мають ниркоподібну форму зеленого кольору, слабкої інтенсивності антоціанове забарвлення. Гілокотиль – середньої довжини.

Рослина за габітусом еректоїдна, детермінантного типу, висока (більше 110 см), з сильною гіллястістю (більше 6), має середні часи настання масового цвітіння (26-32 доби) та досягання (71-80 діб).

Висота головного пагона (стебла) стосовно висоти гілок знаходиться на рівні гілок. Головний пагін – середньо ребристий, на третьому вузлі – товстий, з середніми зонами і галуження, і плодоутворення, має багато вузлів у зоні галуження, низькі прикріплення і першої гілки, і першого суцвіття.

Пагони з майже суцільним поширенням антоціанового забарвлення середньої інтенсивності. Вузли пагонів середньо виражені, блідо-зеленого кольору. Опушення перших двох вузлів сильне.

Третій листок має середні показники довжину черешка, довжини, ширини та розміру. Листкова пластинка середньої товщини з хвилястою поверхнею, стріловидною формою, має зелене забарвлення зі слабо вираженою антоціановою плямою біля основи та слабким червоним забарвленням жилок біля неї, відсутнє або дуже слабке опушення жилок з нижнього боку та нещільні волокна на жилках.

Квітка – дуже великого розміру, гетеростильного типу з блідо-блідо-рожевим кольором оцвітини та овальною формою її листочків, розташування яких дотичне. Квітка має малиновий колір пиляків, грибоподібну форму нектарників та середній аромат.

Пазушне суцвіття (третє суцвіття на головному пагоні) характеризується такими показниками: середньої довжини квітконос, вузькоциліндрична форма середньої щільності, довге.

Термінальне (верхнє) суцвіття на головному пагоні – китиця середньої довжини.

Плід – довгий і широкий з вигнутою напівкільцем формою плодоніжки з середніми її показниками і довжини, і товщини; видовженої форми з середніми крилами, гострими ребрами та гострою формою верхівки.

Форма граней плоду – увігнута, верхівка – гостра з видовженим ступенем вираження основи.

Оплодєнь на час наливу плоду блідо-зеленого кольору, а за повного досягання стає коричневим з наявними рідкими штрихами та відсутнім восковим нальотом на ньому.

Сорт характеризується великою масою 1000 плодів і середньою вирівняністю та помірно плівчастістю.

Середня урожайність сорту за роки випробування: Полісся - 15,7ц/га. Вегетаційний період: Полісся-100 дн.. Висота рослини: П-91,4см. Маса 1000зерен: П-27,6г.Сорт стійкий проти борошнистої роси, переноспорозу. Відносно стійкий до вилягання, осипання, засухи.

Вміст білку становить: Полісся - 15,0%, крупність ядра: П- 38,3%, плівчастість: П-24,2%, вихід круп: П-72,5%.

Агротехніка звичайна для зони вирощування. Добрі результати дає при внесенні повного мінерального живлення.