

від раннього до середнього. Антоціанове забарвлення колоскової луски волоті – відсутнє або дуже слабе. Волоть середньощільна. Час появи шовку на качані – від раннього до середнього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - відсутня або дуже слабка. Антоціанове забарвлення піхви листка – від відсутнього до слабкого. Рослина за довжиною (враховуючи волоть) – довга (від 151 до 200 см). Ніжка качана за довжиною – середня (від 10,1 до 20 см). Качан за формою конусо-циліндричний, за довжиною – від короткого до середнього. Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів – мала (від 10 до 14 шт), колір верхівки зернини – жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня – сильна.

Урожайність по зоні Степу 78,4ц/га, гарантована прибавка складає 16,7 ц/га. Стійкість до засухи 7,8 балів, вилягання 9 балів, пухирчастої сажки 9 балів. Вихід зерна при обмолоті 82,7 %. Вміст крохмалю 72,0 %, білку 9,7 %.

07004013 ХЛ 2015

Заявник: Хайленд Сидс Томпсонс ЛТД

Степ

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - слабе. Волоть щільна. Час появи „шовку” (у 50 % рослин) - від дуже раннього до раннього. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - короткий (15-18 см). Тип зернини зубувий, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовтий, колір низу зернини оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 66,2 ц/га, гарантований приріст складає 6,3 ц/га. Стійкість до засухи 7,5 балів, вилягання - 9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 77,3%. Вміст крохмалю відповідно - 74,0%, білка 9,9%.

07004002 Шаролта

Заявник:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна компанія зернових культур"

Степ, Полісся

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - сильне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - помірне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) - середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок - помірне. Волоть щільна. Час появи „шовку” (у 50 % рослин) - середній. Інтенсивність антоціанового забарвлення „шовку” - слабка. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) - довга (від 151 до 200 см). Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) - середня (від 8,1 до 10,0). Ніжка качана за довжиною - середня. Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною - середній (19-22 см). Тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів середня, колір верхівки зернини - жовто-оранжевий, колір низу зернини жовто-оранжевий, інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня - сильна.

Урожайність по зоні Степу - 79,9 ц/га, Полісся - 84,0 ц/га, гарантований приріст відповідно, складає 13 ц/га та 1 ц/га. Стійкість до засухи 8,1-8,6 балів, вилягання - 8,8-8,9 балів, пухирчастої сажки - 9 балів. Вихід зерна при обмолоті в зоні Степу - 80,5%, Полісся - 79,9 %. Вміст крохмалю відповідно - 73,2% - 71,6%, білка 8,6%.

® 06004070 Яровець 243 МВ

Заявник:

Інститут зернового господарства Української академії аграрних наук

Форма верхівки першого листка - округла. Антоціанове забарвлення піхви першого листка - помірне. Положення листової пластинки в просторі похиле. Антоціанове забарвлення повітряних коренів стебла - сильне. Час повного цвітіння (середня третина головної осі