

дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті. За досягання третій листок від верхівки середньої і довжини, і ширини.

Прапорцевий листок має помірне поширення обезбарвлення середньої жилки, світліше зелене забарвлення її порівняно з листовою пластинкою та відсутнім або дуже слабким жовтим забарвленням.

Волоть в кінці цвітіння щільна. За досягання довжина волоті без шийки - середня, симетричної форми, з відсутньою або дуже короткою видимою шийкою над пазухою та середньої довжини гілочками в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабо розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час досягання вона стає світло-жовтою та короткою.

Приймочка дуже коротка з відсутнім або дуже слабким як антоціановим забарвленням, так і жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння - тьмяно-жовте.

Зернівка після досягання має біле забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; малу поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим забарвленням.

Маса 1000 зерен - велика. Вміст таніну у зернівці - відсутній або дуже низький.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 37,9 ц/га. Сорт відноситься до середньоранньої групи стиглості. Маса 1000 зерен 26,2 г. Висота рослини 106,6 см. Днів до досягання - 117 дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти пухирчатої сажки. Вміст білку - 12,0 %. Вміст крохмалю - 74,3%. Напрямок використання зерно..

07064008 Соларіус

Степ

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та низькою висотою на час викидання волоті, на час досягання – рослина також низька та тонка у верхній третині рослини.

Паросток з помірними показниками антоціанового забарвлення і колеоптиля, і забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок зі слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її (листової пластинки) за викидання волоті.

За досягання третій листок від верхівки – середньої довжини та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвленням її порівняно з листовою пластинкою та відсутнє або дуже слабке її (середньої жилки) жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння - щільна. За досягання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, пірамідальної форми з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці під час цвітіння відсутній або дуже слабо розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час досягання колоскова луска стає темно-червоною і довгою.

Приймочка під час цвітіння – коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та сильним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після досягання має оранжево-червоне забарвлення, еліптичну форму як зі спинки, так і в профіль; середній розмір зародка; велику поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 1/2 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,7ц/га,. Сорт відноситься до пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С- 29,5г. Висота рослини С-108 см. Днів до досягання С-122. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 12,4%. Вміст крохмалю С - 74,6%. Напрямок використання зерно.

07064009 Фулгус

Степ, Лісостеп

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та середньою висотою на час викидання волоті, а на час досягання - низькою висотою та середньою товщиною стебла верхньої третини рослини.

Паросток зі слабким антоціановим забарвленням колеоптіля, дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За досягання третій листок від верхівки – середньої довжини та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабке обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвленням її порівняно з листовою пластинкою та відсутнє або дуже слабке її (середньої жилки) жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння щільна. За досягання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, ширша в нижній частині з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабо розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час досягання вона стає червонувато-коричневою і короткою.

Приймочка під час цвітіння – коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та помірним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричнєве.

Зернівка після досягання має світло-коричнєве забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; малу поверхню, вкриту насінною шкіркою та на 3/4 склоподібну структуру ендосперму в подовжньому розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,9ц/га, Лісостепу - 56,4ц/га. Сорт відноситься до пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-27,9г, Л-30,2г. Висота рослини С-113см, Л-108см. Днів до досягання С-120, Л-130дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 12,6%, Л-9,2%. Вміст крохмалю С - 73,9%, Л-74,1%. Напрямок використання зерно.

Сориз

® 08330001 Атлант

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Рослини гібриду мають паросток дуже світло-зеленого кольору, ранні строки кущіння та середні викидання волоті. На час викидання волоті рослин мають середню висоту.

На час досягання рослини також середньої висоти та характеризуються слабкою здатністю до кущистості та відсутньою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та слабку його залистяність.

Листок на час викидання волоті – зелений, помірної інтенсивності. На час дозрівання листок – короткий та вузький.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має помірне знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення