

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 41,7ц/га. Сорту відносяться до пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-29,5г. Висота рослини С-108 см. Днів до достигання С-122. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С-12,4%. Вміст крохмалю С - 74,6%. Напрям використання зерно.

07064009 Фулгус

Заявник: СЮД СЕРЕАЛЬ

Степ, Лісостеп

Рослини сорту характеризуються середнім часом викидання волоті та середньою висотою на час викидання волоті, а на час достигання - низькою висотою та середньою товщиною стебла верхньої третини рослини.

Паросток зі слабким антоціановим забарвленням колеоптіля, дуже слабким забарвленням як дорсального боку першого листка, так і його пазухи.

Листок з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням листової пластинки у стадії 5-го листка та помірним зеленим забарвленням її за викидання волоті.

За достигання третій листок від верхівки – середньої довжини та вузький.

Прапорцевий листок має відсутнє або дуже слабе обезбарвлення середньої жилки зі світлішим зеленим забарвленням її порівняно з листовою пластинкою та відсутнє або дуже слабе її (середньої жилки) жовте забарвлення.

Волоть в кінці цвітіння щільна. За достигання волоть має середню довжину без шийки, нещільна, ширша в нижній частині з середньою видимою шийкою над пазухою та середньою довжиною гілочок в середній її третині.

Квітка з квітконіжкою під час цвітіння – середньої довжини. Остюк на нижній квітковій лусці відсутній або дуже слабо розвинутий.

На час цвітіння колоскова луска жовто-зеленого кольору з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням і відсутнім або дуже слабким забарвленням опушення, а на час достигання вона стає червонувато-коричневою і короткою.

Приймочка під час цвітіння – коротка з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням та помірним жовтим забарвленням. Забарвлення сухих тичинок після цвітіння – червоно-коричневе.

Зернівка після достигання має світло-коричневе забарвлення, округлу форму зі спинки та еліптичну в профіль, великий розмір зародка; малу поверхню, вкрити насінною шкіркою та на 3/4 склоподібну структуру ендосперму в подовжному розрізі з білим його забарвленням.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за роки випробування в зоні Степу - 39,9ц/га, Лісостепу - 56,4ц/га. Сорту відносяться пізньостиглої групи стиглості. Маса 1000 зерен С-27,9г, Л-30,2г. Висота рослини С-113см, Л-108см. Днів до достигання С-120, Л-130дн. Стійкий до вилягання, засухи. Стійкий проти, пухирчатої сажки. Вміст білка С- 12,6%, Л-9,2%. Вміст крохмалю С - 73,9%, Л-74,1%. Напрям використання зерно.

Сориз

® 08330001 Атлант

Степ

Заявник:

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортознання Української академії аграрних наук

Рослини гібриду мають паросток дуже світло-зеленого кольору, ранні строки кушіння та середні викидання волоті. На час викидання волоті рослин мають середню висоту.

На час достигання рослини також середньої висоти та характеризуються слабкою здатністю до кущистості та відсутньою здатністю до гілкування, мають тонке головне стебло та слабку його залистяність.

Листок на час викидання волоті – зелений, помірно інтенсивності. На час дозрівання листок – короткий та вузький.

Прапорцевий листок на час викидання волоті має помірно знебарвлення середньої жилки. Інтенсивність зеленого забарвлення