

середньої жилки порівняно з пластинкою однакова, а жовте її забарвлення слабе.

Колоскова луска під час цвітіння жовто-зеленого кольору, а при дозрівання – жовто-оранжевого, коротка.

Квітка за довжиною – середня. Приймочка середньої довжини з помірно жовтим забарвленням. На нижній квітковій лусці остюк відсутній або дуже слабо розвинений. Сухі тичинки світло-жовтого кольору.

Волоть на кінець цвітіння щільна, а на час достигання помірно щільна, еліпсоподібна, середньої довжини без шийки та має середні за довжиною гілочки першого порядку в середній третині волоті. Шийка волоті над пазухою – середня.

Зернівка після достигання жовтого кольору, має округлу форму зі спинки і еліптичну в профіль, малий розмір зародка та слабо відкрити поверхню від насінної шкірки.

Структура ендосперму зерна в поздовжньому розрізі на 3/4 склоподібна з дуже високою і екструзивною здатністю, і за твердістю ендосперму. Забарвлення ендосперму – оранжеве.

Маса 1000 зерен – велика.

Урожайність сорту за період випробування в зоні Степу - 59,3 ц/га. Сорт відноситься до середньоранньої групи стиглості. Маса 1000 зерен 39,5 г. Висота рослини 125 см. Стійкий до вилягання, засухи, осипання. Стійкий проти, пухирчатої сажки, гельмінтоспору, кукурудзяного метелика. Вміст білка - 13,9 %. Вміст крохмалю - 72,0 %. Вміст жиру - 3,5%. Вихід круп - 85%.

Рис посівний ярий

08009001 Онтаріо

Степ

Заявник: Інститут рису Української академії аграрних наук

Рослини сорту з безбарвним колеоптиле, відсутньою чоловічою стерильністю, мають пряме положення стебел з середнім часом як викидання волоті, так і часу достигання.

Стебло не здатне утворювати коліно, має середні показники і довжини, і товщини з відсутнім антоціановим забарвленням як міжвузлів, так і вузлів.

Листок помірно зеленого забарвлення, має середні показники і довжини, і ширини, відсутнє антоціанового забарвлення листової пластинки, зеленого колір піхви, відсутню або дуже слабо опушеність поверхні пластинки та середнє старіння (пожовтіння): на час збирання врожаю один листок зберігає свій колір.

Шийка та вушка - без антоціанового забарвлення. Язичок має подвійну форму та безбарвний.

Пропорцевий листок має пряме положення пластинки як за раннього обстеження, так і за пізнього.

Рослини сорту мають середню кількість волотей без остюків з середньою довжиною головної осі та прямим її вигином, без вторинного гілкування. Положення гілок волоті - пряме.

Колосок з білим забарвленням приймочки, має короткої довжини нижню стерильну колоскову луску солом'яного кольору.

Нижня квіткова луска з відсутнім або дуже слабким антоціановим забарвленням як кіля та зони під верхівкою, так і самої верхівки зі слабким її опушенням та білим кольором.

Зернівка має середні довжину та ширину з відсутньою реакцією нижньої квіткової луски на фенол.

Обрушена зернівка білого кольору, без аромату, має напівкруглу форму збоку, середні довжину та ширину.

Ендосперм – неглитинозний, має від 11 до 15 % амілази та слабо дигестує (розщеплюється).

Маса 1000 розвинених зерен – середня (30 г).

Урожайність сорту за період випробування в зоні Степу - 92,6 ц/га. Відноситься до середньостиглої групи. Маса видовжену форму зерна.

Висота рослин - 101 см. Маса 1000 зерен - 32г. Вегетаційний період 120 днів. Сорт стійкий проти хвороб, пірикуляріозу, кореневої гнилі.

Стійкий до осипання, вилягання. Вихід круп - 69,0 %, склоподібність - 98 %, півчастість - 17,5 %, вихід цілого ядра - 91,0%.