

Сільськогосподарські: олійні та прядивні

Соняшник однорічний

07017031 8X449DM

Степ, Лісостеп

Заявник:

Дюу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірно пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки довга. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,3 ц/га, до національних стандартів 5,1 ц/га; в зоні Лісостепу 34,7 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 6,8 ц/га, до національних стандартів 9,3 ц/га. Вміст жиру 51,3 - 52,2%, білку 15,8 - 16,1%, олеїнової кислоти 81%. Вихід олії 1382 - 1584 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017058 Альбатр

Степ, Лісостеп

Заявник:

Євраліс Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, веретиновидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,7 ц/га, гарантована прибавка 0,6 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,2 - 17,3%. Вихід олії 1461 - 1485 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами і пошкодження шкідниками незначне.

06017053 Болліл

Степ, Лісостеп

Заявник:

P2H

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та