

Сільськогосподарські: олійні та прядивні**Соняшник однорічний****07017031 8X449ДМ****Степ, Лісостеп**

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки довга. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,3 ц/га, до національних стандартів 5,1 ц/га; в зоні Лісостепу 34,7 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 6,8 ц/га, до національних стандартів 9,3 ц/га. Вміст жиру 51,3 - 52,2%, білку 15,8 - 16,1%, олеїнової кислоти 81%. Вихід олії 1382 - 1584 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017058 Альбатр**Степ, Лісостеп**

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, веретинovidні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,7 ц/га, гарантована прибавка 0,6 ц/га. Вміст жиру 50,6%, білку 16,2 - 17,3%. Вихід олії 1461 - 1485 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами і пошкодження шкідниками незначне.

06017053 Болліл**Степ, Лісостеп**

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та

великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 30,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 0,1 і 2,1 ц/га. Вміст жиру 51,0 - 51,9 %, білку 15,5 - 16,5 %. Вихід олії 1487 - 1601 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017032 Байзер КЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеподібної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Скоростиглий гібрид з високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,8 ц/га; в зоні Лісостепу 22,3 ц/га. Вміст жиру 50,8%, білку 16,5%, олеїнової кислоти 79,8%. Вихід олії 1406 - 1494 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017091 Голдсан

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, довгі, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика великий, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка дрібна, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.