

великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 30,2 ц/га, гарантована прибавка відповідно 0,1 і 2,1 ц/га. Вміст жиру 51,0 - 51,9 %, білку 15,5 - 16,5 %. Вихід олії 1487 - 1601 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017032 Байзер КЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеподібної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Скоростиглий гібрид з високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,8 ц/га; в зоні Лісостепу 22,3 ц/га. Вміст жиру 50,8%, білку 16,5%, олеїнової кислоти 79,8%. Вихід олії 1406 - 1494 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017091 Голдсан

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, довгі, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика великий, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка дрібна, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1526 - 1572 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017056 Геліабест

Степ

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га. Вміст жиру 50,9 %, олеїнової кислоти 81,0 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1614 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017037 Далія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,5 ц/га, в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 49,6 %, білку 16,4 - 17,2 %. Вихід олії 1457 - 1568 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017040 Дрофа

Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилю. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка велика,