

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1526 - 1572 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017056 Геліабест

Степ

Заявник:

P2H

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма попережного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між крайми відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га. Вміст жиру 50,9 %, олеїнової кислоти 81,0 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1614 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, плесухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017037 Далія КС

Степ, Лісостеп

Заявник:

Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між крайми сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,5 ц/га, в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 49,6 %, білку 16,4 - 17,2 %. Вихід олії 1457 - 1568 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017040 Дрофа

Степ, Лісостеп

Заявник:

Науково-дослідний центр "Магроселект"

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірної-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина висока, галузнення відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка велика,