

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1526 - 1572 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017056 Геліабест

Степ

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 29,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га. Вміст жиру 50,9 %, олеїнової кислоти 81,0 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1614 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017037 Далія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,5 ц/га, в зоні Лісостепу 28,5 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 49,6 %, білку 16,4 - 17,2 %. Вихід олії 1457 - 1568 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017040 Дрофа

Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Паросток має слабе антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчатість слабка, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина висока, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка велика,

широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 28,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,4 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,8 %, білку 15,4 - 16,5 %. Вихід олії 1430 - 1458 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017052 ЕС Флоріміс

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галушенням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в умовах Лісостепу 29,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 3,7 ц/га. Вміст жиру 48,4 - 48,8%, білку 16,6 - 17,4%. Вихід олії 1312 - 1415 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи; ураження хворобами, пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017054 ЕС Діагора

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним помырним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовжені, чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галушенням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Смугастість на краях відсутня або дуже слабка, сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,6 %, білку 16,4 - 17,1 %. Вихід