

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,1 ц/га, да національних стандартів 4,2 ц/а; в зоні Лісостепу 29,4 ц/га - гарантована прибавка до умовного стандарту 1,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,7%, білку 15,7 - 16,9 %. Вихід олії 1483 - 1519 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Соя

07018008 Антарес

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортівивчення Української академії аграрних наук

Ідентифікаційний опис. Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, сірим опушенням, параметрами висоти від середньої до високої, мають ін детермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середні час початку цвітіння та досягання та з відсутнім опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.
- ☐ Листок – темно-зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має заокруглену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.
- ☐ Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,6 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,4 ц/га. Вміст жиру відповідно – 18,5; 18,8; 19,1%. Вміст білку відповідно – 40,0; 40,2; 38,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-19 см. Маса 1000 насінин – 102,5-153,0 г.

Середньостійкий до вилягання. Стійкий до осипання та посухи.

® 06018008 Антошка

Степ

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Сосвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см) та мають проміжний тип росту, сіре опушенням, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння і середній досягання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів 10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий за розміром, ланцетовидної форми із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має серповидну форму та середні показники і довжини (40,1-50,0 мм), і ширини (9,1-12,0 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та жовтим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми без вічком на ньому і без малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,9 ц/га з вмістом жиру 18,2%, білку – 42,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,8 см. Маса 1000 насінин – 149,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

® 06018009 Анастасія

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання, мають висоту від середньої до високої (91- 110 см), сіре опушення, напівстиснуту форму куща.

Час початку цвітіння від дуже раннього до раннього, а час досягання - ранній з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, ланцетної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світлого кольору, серповидної форми та має середню довжину (40,1-50,0 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має жовтого кольору рубчик лінійної форми з відсутнім вічком.

Насіння за масою 1000 зерен – дрібне (менше 130 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 24,4 ц/га, Полісся – 20,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,8; 21,2 і 22,4%, білку – 38,5; 37,4 і 34,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,4-15,1 см. Маса 1000 насінин – 120,6-136,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018005 Богеміанс

Степ, Полісся

Заявник: Семенсес Прогрейн ІНК

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час початку цвітіння та ранній досягання з відсутнім опаданням листя.

□ Стебло з малою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□ Листок – помірно-зеленого кольору та з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

□ Забарвлення квітки – фіолетове.

□ Біб середньої довжини та вузький, прямої форми. Забарвлення бобу – світло-коричнєве.

□ Насінина – округло-випуклої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насінини жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2007-209) у зоні Степу – 20,3 ц/га, Поліссі – 19,9 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,9; 22,1%.

Вміст білку відповідно – 38,2; 35,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-13 см. Стійкий до посухи, осипання та вилягання.

® 06018012 Вінні

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук